



4flu

Vacuna Tetravalente Antigripal Inactivada (Virus Fraccionado) Suspensión Inyectable Industria Argentina Venta Bajo Receta

4flu Pediátrica

Cepas OMS temporada 2024 para hemisferio sur

FÓRMULA

4flu*

Inгредиенты activos: Vacuna purificada, inactivada de virus fraccionado. Cada dosis de 0,5 ml contiene antígenos para la estación de la gripe de 2024 representativos de los siguientes tipos:

- A/Victoria/4897/2022 (H3N1) pdm09- cepa análoga (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 15 µg de hemaglutinina por dosis
A/Thailand/8/2022 (H3N2)- cepa análoga (A/Thailand/8/2022, IVR-237) 15 µg de hemaglutinina por dosis
B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria)- cepa análoga (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) 15 µg de hemaglutinina por dosis
B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata)- cepa análoga (B/Phuket/3073/2013, BVR-18) 15 µg de hemaglutinina por dosis

Excipientes: Cloruro de sodio 0,41 mg, fosfato de sodio dibásico anhídrido 0,3 mg, fosfato de sodio monobásico 0,08 mg, cloruro de potasio 0,02 mg, fosfato de potasio monobásico 0,02 mg, cloruro de calcio 0,5 mg, agua para inyectables c.s.p. 0,50 ml.

4flu* Pediátrica

Inгредиенты activos: Vacuna purificada, inactivada de virus fraccionado. Cada dosis de 0,25 ml contiene antígenos para la estación de la gripe de 2024 representativos de los siguientes tipos:

- A/Victoria/4897/2022 (H3N1) pdm09- cepa análoga (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 7,5 µg de hemaglutinina por dosis
A/Thailand/8/2022 (H3N2)- cepa análoga (A/Thailand/8/2022, IVR-237) 7,5 µg de hemaglutinina por dosis
B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria)- cepa análoga (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) 7,5 µg de hemaglutinina por dosis
B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata)- cepa análoga (B/Phuket/3073/2013, BVR-18) 7,5 µg de hemaglutinina por dosis

Excipientes: Cloruro de sodio 2,05 mg, fosfato de sodio dibásico anhídrido 0,15 mg, fosfato de sodio monobásico 0,04 mg, cloruro de potasio 0,01 mg, fosfato de potasio monobásico 0,01 mg, cloruro de calcio 0,25 mg, agua para inyectables c.s.p. 0,25 ml. Cantidades traza de los siguientes también pueden estar presentes en 4flu* / 4flu* Pediátrica: taurodesoxicolato de sodio (TDOC), albúmina de huevo (< 1 µg), sacarosa, sulfato de neomicina, sulfato de polimixina B y beta-propiolactona e hidrocloroteno.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable por vía intramuscular o subcutánea profunda.

La vacuna se presenta en forma de líquido transparente a ligeramente opalescente con algún sedimento que se vuelve a suspender al agitarlo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inmunización contra la gripe

Código ATC (Clasificación Terapéutica): J07B 02

INDICACIONES

Para la prevención de influenza causada por el Virus Influenza. Tipo A y B, contenidos en la vacuna.

La vacuna está indicada para uso en personas a partir de los 6 meses de edad.

La vacuna 4flu* está indicada para uso en personas a partir de 3 años de edad.

La vacuna 4flu* Pediátrica está indicada para su uso en niños desde los 6 meses a 35 meses de edad inclusive.

Para más detalles acerca de las recomendaciones de la vacuna antigripal, consultar los lineamientos nacionales de inmunización correspondientes.

Perfilación de la gripe, particularmente en sujetos que corren mayor riesgo de complicaciones asociadas.

La vacuna se puede suministrar a cualquier persona, sin embargo, es particularmente recomendada para los siguientes grupos de población:

- 1) Niños y adultos que sufren de:
- enfermedades crónicas graves de los aparatos respiratorio, cardiovascular y urinario;
- enfermedades de los órganos hematopoyéticos;
- diabetes u otras enfermedades que comprometan el metabolismo;
- síndromes de mala absorción intestinal, fibrosis quística del páncreas;
- enfermedades congénitas o adquiridas que ocasionan una carencia o disminución de la producción de anticuerpos;
- patologías que requieran cirugías importantes;
2) Personas mayores de 65 años;
3) Personal de salud;
4) Enfermeros o familiares de pacientes con alto índice de riesgo;
5) Personas que requieren administración prolongada de ácido acetilsalicílico, para evitar el riesgo de síndrome de Reye después de una infección con el virus de la gripe.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES

No se han correlacionado los niveles específicos de titulaciones de anticuerpos de inhibición de hemaglutinación post-vacunación con vacuna antigripal inactivada con la protección contra el virus de la influenza. En algunos estudios realizados en humanos, las titulaciones de anticuerpos de 1:40 o mayores han estado asociadas con la protección contra la gripe en hasta el 50% de los sujetos. Los anticuerpos contra un tipo o subtipo de virus de influenza confieren una protección limitada o nula contra otro. Además, un anticuerpo para una variante antigénica del virus de la influenza puede no proteger contra una nueva variante antigénica del mismo tipo o subtipo.

Se recomienda la revacunación anual con la vacuna actual porque la inmunidad disminuye durante el año posterior a la vacunación y las cepas circulantes del virus de la influenza cambian de año en año.

POSOLÓGIA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN

Table with 4 columns: Grupo etario, Presentación, Dosis, No. de dosis. Rows for Pediatric (6 meses a 35 meses, 3 años a < 9 años, 9 años a < 18 años) and Adultos (≥ 18 años).

*Los niños de 6 meses a < 9 años que no recibieron ninguna vacunación previa deben recibir 2 dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas entre cada aplicación.

El sitio preferido para la inyección es el músculo deltoides de la parte superior del brazo.

La vacuna puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, sin embargo, se deben utilizar distintas jeringas y debe aplicarse en diferente brazo.

El sitio preferido para vacunar a bebés y niños pequeños con masa muscular deltoides insuficiente es la región anterolateral del mudo.

La vacuna debe administrarse por vía intramuscular o subcutánea profunda.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

Agitar antes de usar: Una vez agitada, la apariencia normal de la vacuna debe ser la de una suspensión clara, incolora a ligeramente opalescente.

Inspeccionar visualmente el contenido de cada jeringa pre-llenada de 4flu* / 4flu* Pediátrica para detectar partículas extrañas y/o cambios en la apariencia antes de la administración. Si se observara alguna de estas condiciones, no administrar la vacuna.

No administrar la vacuna después de la fecha de vencimiento impresa en el envase.

CONTRAINDICACIONES

La vacuna 4flu* / 4flu* Pediátrica está contraindicada en individuos con reacciones alérgicas graves conocidas (ej.: anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna, o a una dosis previa de cualquier vacuna contra la influenza.

ADVERTENCIAS

Al igual que con todas las vacunas inyectables, el tratamiento y la supervisión médica adecuados deben estar siempre disponibles en el raro caso de que se produzca una reacción alérgica después de la administración de la vacuna.

En pacientes inmunocomprometidos, la respuesta de anticuerpos puede ser menor.

PRECAUCIONES

Interacciones

No se han realizado estudios de interacción entre las vacunas contra la gripe y otras vacunas o medicamentos en general.

Fertilidad

4flu* no ha sido evaluado por su posible efecto sobre la fertilidad.

Un estudio reproductivo de ratas hembras vacunadas con la vacuna trivalente no reveló deterioro de la fertilidad.

Embarazo

Los datos recolectados en un registro prospectivo de exposición en el embarazo en 483 mujeres vacunadas con 4flu* no revelaron evidencia de resultados adversos en el feto, recién nacido o en la embarazada atribuibles a la vacuna en cualquier etapa del embarazo.

Lactancia

La seguridad y eficacia de 4flu* no se ha establecido en madres que amamantan.

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos:

Estudios en adultos:

CSLCT-QIV-13-02 (NCT02214225) fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego que evaluó la inmunogenicidad y seguridad de 4flu* en comparación con una vacuna contra la influenza trivalente (TV-1) de Seqirus y una vacuna trivalente contra la influenza que contiene la cepa B alternativa (TV-3), en adultos de > 18 años. La seguridad se evaluó por la frecuencia y la gravedad de los efectos adversos locales solicitados y los eventos adversos sistémicos durante siete días después de la vacunación; reacción similar a la celulitis, celulitis e induración/inflamación en el sitio de inyección de Grado 3 durante 28 días después de la vacunación, EAs no solicitados durante 28 días después de la vacunación y EAs serios durante 6 meses después de la vacunación.

El porcentaje de sujetos en cada grupo de vacuna y cohorte de edad que informaron reacciones adversas locales y eventos adversos sistémicos se muestran en la Tabla 1.

En adultos de 18 a < 65 años administrados con 4flu*, la reacción adversa local más frecuentemente reportada fue dolor (> 40%). Los eventos adversos sistémicos reportados fueron migraña y dolor de cabeza (> 20%).

En adultos > 65 años administrados con 4flu*, la reacción adversa local más frecuentemente reportada fue dolor (> 20%). El evento adverso sistémico más frecuentemente reportado fue migraña (> 10%).

Tabla 1: Incidencia de Reacciones Adversas Locales Solicitadas y Eventos Adversos Sistémicos en Población de Adultos y Mayores dentro de los 7 días siguientes a la administración de la vacuna 4flu* (Estudio CSLCT-QIV-13-01)

Table with 3 columns: Sistema de Clasificación de Órganos, Adultos de 18 a < 65 años (N=854)*, Mayores ≥ 65 años (N=867)*. Rows include Trastornos del sistema nervioso, Trastornos gastrointestinales, Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo, and Desórdenes generales y condiciones en el sitio de administración.

* N = número de sujetos en la Población de Seguridad Solicitada (sujetos que fueron vacunados y contribuyeron con cualquier información de seguridad solicitada) para cada grupo de vacuna del estudio.

* Definición de categoría Frecuencia: Muy frecuente (≥ 1/10); Frecuente (≥ 1/100, < 1/10); Poco Frecuente (≥ 1/1.000, < 1/100).

* Porcentaje (%) se deriva del número de sujetos que informaron el evento dividido por la población de seguridad en cada grupo de vacuna y cohorte de edad.

Ningún sujeto experimentó una reacción similar a la celulitis o celulitis en el sitio de inyección en cualquiera de los tres grupos de vacunas durante el estudio.

El siguiente evento adverso no solicitado relacionado se informó en ≥ 1% de los sujetos de > 18 años: fiebre (1,0%).

Tabla 2: Proporción de Sujetos según la Cohorte de Edad con Cualquier Reacción Adversa Local Solicitada o Eventos Adversos Sistémicos dentro de los 7 días siguientes a la administración de la vacuna 4flu* o la vacuna Trivalente Antigripal (TV) (Estudio CSLCT-QIV-13-01)

Table with 3 main columns: Sujetos 18 a < 65 años, Sujetos ≥ 65 años. Sub-columns for 4flu* N=854, TV-1 N=428, TV-2 N=430, 4flu* N=867, TV-1 N=436, TV-2 N=434. Rows include Reacciones adversas locales (Dolor, Tumoración/masa, Enrojecimiento) and Eventos adversos sistémicos (Migraña, Cefalea, Malestar, Náuseas, Escalofríos, Vómitos, Fiebre).

Gr: Grado

*Proporción de sujetos que informan cada reacción adversa local solicitada o evento adverso sistémico según el grupo de vacuna del estudio sobre la base del número de sujetos que contribuyeron con cualquier información de seguimiento sobre seguridad durante al menos un valor del dato de un signo/síntoma individual.

* N = número de sujetos en la Población de Seguridad para cada grupo de vacuna del estudio.

* Reacciones adversas locales: Dolor (Grado 3 es aquel que impide la realización de actividades cotidianas); Tumoración/masa y Enrojecimiento: Cualquier = ≥ 20mm de diámetro; Grado 3 = ≥ 100mm de diámetro.

* Eventos adversos sistémicos: Fiebre: Cualquier = ≥ 100,4°F/38,0°C (Oral), Grado 3 = ≥ 102,2°F/39,0°C (Oral); Grado 3 para los demás EAs son aquellos que implican la realización de actividades cotidianas.

Ningún sujeto experimentó una reacción similar a la celulitis o celulitis en el sitio de inyección en cualquiera de los tres grupos de vacunas durante el estudio.

En el estudio CSLCT-QIV-13-01 la cefalea fue la reacción adversa no solicitada reportada más frecuentemente (3,8%) en sujetos de ≥ 18 años de edad que recibieron la vacuna 4flu*. Otras reacciones adversas no solicitadas reportadas frecuentemente (informadas por ≥ 1% de los sujetos) fueron dolor orofaríngeo (1,8%), dolor de espalda (1,5%), diarrea (1,3%) y rinorea (1%).

En los sujetos de 18 a < 65 años que recibieron la vacuna 4flu*, las reacciones adversas informadas con mayor frecuencia fueron cefalea (5,3%), dolor orofaríngeo (2,5%), dolor de espalda (1,9%), diarrea (1,6%), tos (1,3%) y náuseas (1,1%).

En los adultos ≥ 65 años que recibieron la vacuna 4flu*, las reacciones adversas no solicitadas informadas frecuentemente fueron cefalea (2,3%), rinorea (1,3%), dolor orofaríngeo (1,2%) y dolor de espalda (1,2%).

Estudios en Pediatría:

5 a < 18 años de edad CSLCT-QIV-13-02 (NCT02545543, ver http://clinicaltrials.gov) fue un ensayo aleatorizado, observador-ciego, similar-controlado que evaluó la inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna 4flu* en sujetos de 5 a menos de 18 años utilizando una vacuna contra la influenza cuadrivalente similar a la temporada 2015-2016. Se programó que los sujetos del estudio recibirían una dosis única o un esquema de dos dosis dependiendo de su edad y su historial de vacunación. Se informaron reacciones adversas locales (sitio de inyección) y eventos adversos sistémicos durante los 7 días siguientes a la vacunación (Tabla 3). Los eventos adversos reportados y las reacciones similares a la celulitis en el sitio de inyección se recolectaron durante los 28 días siguientes a la última vacunación; y eventos adversos serios durante los seis meses posteriores a la última vacunación. La vacuna 4flu* fue administrada a niños de 5 a menos de 9 años de edad, las reacciones más frecuentes (≥ 10%) en el sitio de inyección fueron dolor (51,3%), enrojecimiento (19,4%) e induración (15,3%); el evento adverso sistémico reportado más frecuentemente fue cefalea (12,3%).

En niños de 9 a menos de 18 años de edad, las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) en el sitio de inyección fueron dolor (51,5%), enrojecimiento (14,8%) e induración (12,2%); los eventos adversos sistémicos solicitados más frecuentes fueron cefalea (18,8%), migraña (16,7%) y malestar/fatiga (10%).

En niños de 5 a menos de 18 años de edad, las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) en el sitio de inyección fueron dolor (51,4%), enrojecimiento (17,1%) e induración (13,8%); los eventos adversos sistémicos solicitados más frecuentes fueron cefalea (15,5%) y migraña (13,1%).

Las reacciones locales solicitadas y los eventos adversos sistémicos en la Población de Seguridad en niños de 5 a menos de 18 años de edad se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3: Incidencia de Reacciones Adversas Locales Solicitadas y Eventos Adversos Sistémicos en la población de Seguridad Pediátrica de 5 a menos de 18 años de edad dentro de los 7 días siguientes a la administración de la vacuna 4flu* (Estudio CSLCT-QIV-13-02)

Sistema de Clasificación de Órganos	Niños de 5 a < 9 años (N=829) [†]		Niños de 9 a < 18 años (N=792) [†]	
	Frecuencia Categoría [‡] (%)		Frecuencia Categoría [‡] (%)	
Trastornos del sistema nervioso				
Cefalea	Muy Frecuente (12,3%)		Muy Frecuente (18,8%)	
Trastornos gastrointestinales				
Náuseas	Frecuente (7,1%)		Frecuente (7,7%)	
Diarrea	Frecuente (5,2%)		Frecuente (5,4%)	
Vómitos	Frecuente (2,4%)		Frecuente (1,8%)	
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo				
Mialgia	Frecuente (9,8%)		Muy Frecuente (16,7%)	
Desórdenes generales y condiciones en el sitio de administración				
Dolor en el sitio de inyección	Muy Frecuente (51,3%)		Muy Frecuente (51,5%)	
Enrojecimiento	Muy Frecuente (19,4%)		Muy Frecuente (14,8%)	
Inflamación / induración en el sitio de inyección	Muy Frecuente (15,3%)		Muy Frecuente (12,2%)	
Malestar/Fatiga	Frecuente (8,8%)		Muy Frecuente (10,0%)	
Fiebre (Oral) (≥ 38°C)	Frecuente (4,5%)		Frecuente (2,1%)	

*N = número de sujetos en la Población de Seguridad Solicitada (sujetos que fueron vacunados y contribuyeron con cualquier información de seguridad solicitada) para cada grupo de vacuna del estudio.

[†]Definición de categoría Frecuencia: Muy Frecuente (≥ 1/10); Frecuente (≥ 1/100, < 1/10); Poco Frecuente (≥ 1/1.000, < 1/100).

[‡]Porcentaje (%) se deriva del número de sujetos que informaron el evento dividido por la población de seguridad en cada grupo de vacuna y cohorte de edad.

Un sujeto experimentó una reacción similar a la celulitis (definida como un dolor severo concurrente, enrojecimiento e inflamación) en el sitio de inyección luego de la vacunación con 4flu*.

No fueron reportados eventos adversos relacionados no solicitados en ≥ 1% de los sujetos de 5 a menos de 18 años de edad.

Tabla 4: Proporción de sujetos por cohorte de edad con cualquier Reacción Adversa Local Solicitada o Eventos Adversos Sistémicos dentro de los 7 días posteriores a la administración de la vacuna 4flu* o Comparador QIV (Estudio CSLCT-QIV-13-02)

Reacciones adversas locales [†]	Porcentaje (%)* de Sujetos en cada Cohorte de Edad que Informaron un Evento											
	Niños de 5 a < 9 años						Niños de 9 a < 18 años					
	4flu* N= 829 [‡]			Comparador QIV N= 274 [‡]			4flu* N= 792 [‡]			Comparador QIV N= 261 [‡]		
	Cualquier RA	Gr 3		Cualquier RA	Gr 3		Cualquier RA	Gr 3		Cualquier RA	Gr 3	
Reacciones adversas locales[†]												
Dolor	51,3	0,8	49,6	0,7	51,5	0,3	45,2	0,4				
Enrojecimiento	19,4	3,5	18,6	1,8	14,8	1,9	16,1	1,9				
Tumefacción/masa	15,3	3,4	12,4	2,2	12,2	2,0	10,7	1,9				
Eventos adversos sistémicos[‡]												
Cefalea	12,3	0,1	10,6	0,4	18,8	0,4	14,6	0,4				
Mialgia	9,8	0,1	11,3	0,4	16,7	0,3	11,1	0,4				
Malestar/Fatiga	8,8	0,4	5,8	0	10,0	0,4	7,7	0,0				
Náuseas	7,1	0,1	8,4	0	7,7	0	8,0	0				
Diarrea	5,2	0	3,6	0	5,4	0	4,2	0				
Fiebre (Oral)	4,5	1,2	3,6	0,7	2,1	0,5	0,8	0				
Vómitos	2,4	0,2	4,4	0	1,8	0	2,3	0				

Gr: Grado; Comparador QIV (Fluzon Quadrivalent (GSK Biologicals))

*Porcentaje (%) se deriva del número de sujetos que informaron el evento dividido por la Población de Seguridad Solicitada en cada grupo de vacuna y cohorte de edad.

[†]N = número de sujetos en la Población de Seguridad Solicitada para cada grupo de vacuna del estudio. La Población de Seguridad Solicitada fue la misma para cada evento.

[‡]Reacciones adversas locales: Dolor Grado 3 es aquel que impide la realización de actividades cotidianas; Tumefacción/masa y Enrojecimiento: Cualquier = ≥ 20mm diámetro, Grado 3 = ≥ 100mm de diámetro.

[§]Eventos Adversos Sistémicos: Fiebre: Cualquier RA = ≥ 100,4°F/38,0°C (Oral), Grado 3 = ≥ 102,2°F/39,0°C (Oral); Grado 3 para los demás EAs son aquellos que impiden la realización de actividades cotidianas.

No hubo muertes relacionadas en este estudio pediátrico CSLCT-QIV-13-02. Hubo un evento adverso serio relacionado a la vacuna (influenza) reportado en el estudio.

En el estudio CSLCT-QIV-13-02, los (2,1%) fue el evento adverso no solicitado más frecuente en niños de 5 a menos de 18 años de edad administrados con 4flu*.

Otros eventos adversos no solicitados reportados frecuentemente (reportados por ≥ 1% de sujetos) fueron dolor orofaríngeo (1,3%), pirexia (1,3%) e infección del tracto respiratorio superior (1,1%).

Los eventos adversos no solicitados más frecuentemente informados entre los sujetos que recibieron 4flu* en edades de 5 a menos de 9 años después de la primera o segunda dosis inyectaron tos (2,8%), pirexia (2,1%), cefalea (1,2%), rinorrea (1,2%), infección del tracto respiratorio superior (1,2%), enfermedad similar a la gripe (1,0%) y dolor orofaríngeo (1,0%).

Para sujetos de 9 a menos de 18 años que recibieron 4flu*, los eventos adversos no solicitados más frecuentes incluyeron dolor orofaríngeo (1,6%), tos (1,3%) e infección del tracto respiratorio superior (1,0%).

6 meses a < 5 años de edad

CSLCT-QIV-15-03 (NCT02914275), fue un ensayo aleatorio, ciego al observador, controlado con comparador realizado en los Estados Unidos en 2247 niños de entre 6 meses y menos 5 años de edad. Los sujetos fueron estratificados en una de dos cohortes de edad de 6 meses a menos de 3 años o 3 a menos de 5 años. Sujetos en la población de seguridad (N = 2232) recibieron 4flu* (N = 1673) o una vacuna inactiva tetraavalente comparadora con licencia de EE.UU. (N = 559). Se programó que los sujetos del estudio recibieran una dosis única o un esquema de dos dosis dependiendo de su edad y su historial de vacunación.

Se solicitó registrar reacciones adversas locales (sitio de inyección) y eventos adversos sistémicos durante 7 días luego de la vacunación. Se monitorearon las reacciones similares a la celulitis en el sitio de inyección durante 28 días después de la vacunación. Los eventos adversos no solicitados se recolectaron durante 28 días después de la vacunación y eventos adversos serios durante 6 meses después de la última vacunación. Todas las reacciones adversas locales y eventos adversos sistémicos después de cualquier vacunación (primera o segunda dosis) se presentan en la Tabla 5.

En bebés y niños de 6 meses a menos de 3 años de edad, las reacciones adversas más frecuentes en el sitio de inyección (≥ 10%) fueron dolor (20,8%) y enrojecimiento (20,8%); los eventos adversos sistémicos solicitados más frecuentes fueron irritabilidad (32,9%), diarrea (24,2%) y disminución del apetito (20,0%).

En niños de 3 a menos de 5 años de edad, las reacciones adversas más frecuentes en el sitio de inyección (≥ 10%) fueron dolor (35,5%), enrojecimiento (22,4%) e hinchazón/induración (10,1%); los eventos adversos sistémicos solicitados más frecuentes fueron malestar/fatiga (14,3%) y diarrea (12,1%).

Tabla 5: Incidencia de Reacciones Adversas Locales Solicitadas y Eventos Adversos Sistémicos en Población de Seguridad Pediátrica de 6 meses a menos de 5 años de edad dentro de los 7 días posteriores a la vacunación con 4flu* (Estudio CSLCT-QIV-15-03)

Sistema de Clasificación de Órganos	Niños de 6 meses a < 3 años (N=669) [†]		Niños de 3 a < 5 años (N=949) [†]	
	Frecuencia Categoría [‡] (%)		Frecuencia Categoría [‡] (%)	
Trastornos psiquiátricos				
Irritabilidad	Muy Frecuente (32,9%)		-	
Trastornos del sistema nervioso				
Cefalea	-		Frecuente (6,2%)	
Trastornos gastrointestinales				
Diarrea	Muy Frecuente (24,2%)		Muy Frecuente (12,1%)	
Disminución del apetito	Muy Frecuente (20,0%)		-	
Náuseas/Vómitos	Frecuente (9,4%)		Frecuente (9,2%)	
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo				
Mialgia	-		Frecuente (9,9%)	

Desórdenes generales y condiciones en el sitio de administración		
Dolor en el sitio de inyección	Muy Frecuente (20,8%)	Muy Frecuente (35,5%)
Enrojecimiento	Muy Frecuente (20,8%)	Muy Frecuente (22,4%)
Inflamación / induración en el sitio de inyección	Frecuente (6,1%)	Muy Frecuente (10,1%)
Malestar/Fatiga	-	Muy Frecuente (14,3%)
Fiebre (Axilar) (≥ 37,5°C)	Frecuente (7,2%)	Frecuente (4,8%)

[†]N = número de sujetos en la Población de Seguridad Solicitada (sujetos que fueron vacunados y contribuyeron con cualquier información de seguridad solicitada) para cada grupo de vacuna del estudio.

[‡]Definición de categoría Frecuencia: Muy Frecuente (≥ 1/10); Frecuente (≥ 1/100, < 1/10).

[§]Porcentaje (%) se deriva del número de sujetos que informaron el evento dividido por la Población de Seguridad Solicitada en cada grupo de vacuna y cohorte de edad.

*-: Denota que el evento no fue aplicable a esa cohorte de edad.

Los siguientes eventos adversos no solicitados relacionados fueron reportados en ≥ 1% de los niños de 6 meses a menos de 5 años de edad: rinorrea (2,2%) y tos (1,8%).

Tabla 6: Proporción de sujetos por cohorte de edad con cualquier Reacción Adversa Local Solicitada o Eventos Adversos Sistémicos dentro de los 7 días posteriores a la vacunación con 4flu* o Comparador QIV (Estudio CSLCT-QIV-15-03)[†]

Reacciones adversas locales [†]	Porcentaje (%)* de Sujetos en cada Cohorte de Edad que Informaron un Evento											
	Niños de 6 meses a < 3 años						Niños de 3 a < 5 años					
	4flu* N= 669 [‡]			Comparador QIV N= 227 [‡]			4flu* N= 949 [‡]			Comparador QIV N= 318 [‡]		
	Cualquier RA	Gr 3		Cualquier RA	Gr 3		Cualquier RA	Gr 3		Cualquier RA	Gr 3	
Reacciones adversas locales[†]												
Dolor	20,8	0,1	25,6	0,4	35,5	0	31,4	0,6				
Enrojecimiento	20,8	0,6	17,6	1,8	22,4	2,3	20,8	5,3				
Tumefacción/masa	6,1	0,4	6,2	0,9	10,1	1,7	12,9	2,5				
Eventos adversos sistémicos[‡]												
Irritabilidad	32,9	0,7	28,2	0,4	-	-	-	-				
Diarrea	24,2	0,1	25,6	0,4	12,1	0,1	8,8	0,6				
Disminución del apetito	20,0	0,3	19,4	0,4	-	-	-	-				
Malestar/Fatiga	-	-	-	-	14,3	0,5	13,2	0,3				
Mialgia	-	-	-	-	9,9	0,1	9,4	0				
Náuseas y Vómitos	9,4	0,7	11,0	0	9,2	0,4	6,6	0,3				
Cefalea	-	-	-	-	6,2	0,4	5,0	0				
Fiebre (Axilar)	7,2	2,5	11,9	2,6	4,8	1,2	6,0	0,9				

Gr: Grado; Comparador QIV (Fluzone Quadrivalent (Sanofi Aventis))

[†]NCT02914275.

*Porcentaje (%) se deriva del número de sujetos que informaron el evento dividido por la Población de Seguridad Solicitada en cada grupo de vacuna y cohorte de edad.

[‡]N = número de sujetos en la Población de Seguridad Solicitada (sujetos que fueron vacunados y contribuyeron con cualquier información de seguridad solicitada) para cada grupo de vacuna del estudio. La población de seguridad solicitada fue la misma para cada evento.

[§]Reacciones adversas locales: Dolor Grado 3 es aquel que impide la realización de actividades cotidianas (niños de 36 a 59 meses de edad) o lioran cuando la extremidad se movió o presentaba dolor espontáneamente (niños de 6 a 35 meses de edad); Tumefacción/masa y Enrojecimiento: Cualquier = ≥ 0mm diámetro, Grado 3 = ≥ 30mm de diámetro.

[¶]Eventos adversos sistémicos: Fiebre: Cualquier RA = ≥ 99,5°F/37,5°C; Grado 3 = ≥ 101,3°F/38,5°C; Grado 3 para los demás EAs son aquellos que impiden la realización de actividades cotidianas donde "-" denota que el evento no fue aplicable a esa cohorte de edad.

Los eventos adversos no solicitados más frecuentemente informados en los 28 días posteriores a la primera o la segunda dosis de 4flu* en niños de 6 meses a menos de 3 años de edad fueron rinorrea (11,2%), tos (10,4%), pirexia (6,3%), infección del tracto respiratorio superior (4,8%), diarrea (3,7%), otitis media (2,4%), vómitos (2,4%), congestión nasal (2,4%), nasofaringitis (1,9%), irritabilidad (1,7%), infección del oído (1,6%), crup infeccioso (1,4%), detención (1,3%), erupción cutánea (1,2%), enfermedad similar a la influenza (1,0%) y fatiga (1,0%), y fueron similares al comparador.

Los eventos adversos no solicitados más frecuentemente reportados en los 28 días posteriores a la primera o la segunda dosis de 4flu* en niños de 3 años a menos de 5 años de edad fueron tos (7,7%), rinorrea (4,9%), pirexia (3,7%), infección del tracto respiratorio superior (2,5%), vómitos (2,1%), congestión nasal (1,6%), nasofaringitis (1,7%), dolor orofaríngeo (1,2%), diarrea (1,1%) y fatiga (1,1%), y fueron similares al comparador.

Reacciones Adversas de los informes espontáneos posteriores a la comercialización:

Los siguientes eventos adversos se informaron espontáneamente durante el uso posterior a la aprobación de 4flu* entre adultos y niños ≥ 6 meses de edad y se complementan a los eventos observados durante los ensayos clínicos. Los eventos adversos informados son presentados a continuación de acuerdo con la clasificación de órganos del sistema. En el escenario post-comercialización, las reacciones se informan de manera espontánea y la población exacta expuesta a la vacuna se desconoce, por lo tanto, la frecuencia exacta no está establecida.

Trastornos del Sistema Linfático y Sangüíneo: Trombocitopenia.

Trastornos del Sistema Nervioso: Neuralgia, parestesia y convulsiones, mareo, encefalomielitis, neuritis o neuropatía, síndrome de Guillain-Barre, síncope, pre-síncope.

Trastornos Vasculares: Vasculitis que se puede asociar con afectación renal.

Trastornos Musculoesqueléticos y del Tejido Conectivo: Dolor musculoesquelético, dolor en las extremidades.

Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo: Prurito, urticaria, rash.

Trastornos Generales y Condiciones en el Sitio de Administración: Enfermedad similar a la gripe, disminución de la movilidad en las extremidades inyectadas, pirexia, eritema, reacción en el sitio de inyección.

Información para profesionales médicos

4flu* / 4flu* Pediátrica se encuentra incluido dentro de un Plan de Gestión de Riesgo (conjunto de actividades en Farmacovigilancia para prevenir o minimizar riesgos relacionados con productos medicinales).

SOBREDOFISICACIÓN

No hay información específica disponible para sobredosis con 4flu* / 4flu* Pediátrica.

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar en refrigerador (+2°C / +8°C). **NO CONGELAR.** Desechar la vacuna si ha sido congelada. Mantener la jeringa dentro de la caja para protegerla de la luz.

La vacuna es válida hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase, siempre y cuando se conserve correctamente con su estuche intacto.

No utilizar el producto luego de la fecha de su vencimiento.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIONES

4flu*: Envase contenido 1 y 10 jeringas pre-llenadas monodosis de 0,5 mL.

4flu* Pediátrica: Envase contenido 1 y 10 jeringas pre-llenadas monodosis de 0,25 mL.

Especialidad Médica autorizada por el Ministerio de Salud – Certificado N° 59.165

* Marca registrada.

Elaborado en: Sinergium Biotech S.A., Ruta 9 Km 38,7, Garín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: Sebastian Enrique Comellas – Farmacéutico.

Fecha de la última revisión: Noviembre 2023.